

DES SITUATIONS TRES CONTRASTEES

Sur la semaine du 23 au 30 mai, la croissance de l'herbe sur la région s'établit à 65 kg MS/ha/jour, dans la moyenne observée à cette date. Cette valeur moyenne cache des disparités importantes entre zones géographiques et entre exploitations.

Une zone Nord 44 et 49 en retrait

Alors que nous observons des croissances moyennes entre 65 et 75 kg MS/ha/j sur la majorité de la région, le nord 44 et 49 marque le pas cette semaine avec à peine 50 kg MS. Les précipitations orageuses sont certes hétérogènes mais ces écarts de pousse ne peuvent aujourd'hui s'expliquer par des facteurs climatiques, les conditions actuelles étant favorables à la croissance de l'herbe. Par contre, sur certaines exploitations, la part de surface fauchée récemment est élevée et ces parcelles sont en phase de redémarrage avec une croissance plus faible. De même, ces niveaux de pousse variés s'expliquent également par les stades physiologiques des espèces présentes dans les prairies (décalages d'épiaison).

S'adapter à chaque situation

Début juin, on vise 15 à 20 jours d'avance au pâturage. Pour les exploitations qui disposent de davantage de jours d'avance, l'excédent pourra être fauché en foin précoce ou en enrubannage lors de la prochaine fenêtre météo propice. Plus ces fauches seront précoces, plus on sécurise le volume de repousses après et donc le retour dans le circuit de pâturage de ces parcelles. La météo annonce une semaine prochaine estivale favorable.

Dans les exploitations où la pousse est ralentie, les temps de repousse doivent être allongés pour ne pas entrer dans les parcelles à moins de 10-12 cm. Selon les surfaces disponibles, avec la réintroduction de parcelles fauchées, l'affouragement peut être nécessaire.

Maîtriser les épis, fauche des refus

Seuls certains raygrass anglais tardifs et très tardifs ne sont pas encore épiés. Le pâturage actuel de ces parcelles permettra de faire manger l'épi par les animaux. Les autres graminées sont déjà épiées et ont généré des refus plus ou moins importants. La fauche des refus est en pleine actualité (cf bulletin de la semaine dernière). Si leur quantité est élevée, ils peuvent être récoltés lors du prochain chantier de foin. En quantité plus faible, ils peuvent être pâturés après 1 journée de préfanage.

Rédigé le 31 mai 2016

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance Sèvres Vendée.

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) 23 au 30 mai 2016	Hauteur moyenne (cm)	Jours d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)					
			20 ares/VL	30 ares/VL	40 ares/VL	50 ares/VL	40 ares/VA+v	50 ares/VA+v
Zone Nord	69	13,9	20	31	41	51	38	47
Zone Intermédiaire	64	9,3	10	15	20	25	18	23
Zone Sud - Nord Loire	48	10,2	12	18	24	30	22	27
Zone Sud - Sud Loire	75	11,9	16	24	32	40	29	37