

Bulletin pousse de l'herbe régional N°1. Rédigé le 01/03/2016

Trente fermes suivies sur la région Pays de la Loire

Le suivi de la croissance de l'herbe reprend du service cette semaine. 30 fermes de la région vont être suivies tout au long du printemps. Ces exploitations bovines laitières ou allaitantes pratiquent toutes le pâturage tournant. Dans la plupart des cas, le temps de présence des animaux est entre 2 et 4 jours avec un nombre de parcelles (de 8 à 25) variable lié à la surface disponible (20 à 60 ares/UGB). Trois exploitations (Derval 44, Thorigné 49 et Beaumont 72) sont en pâturage tournant simplifié avec 3 à 5 parcelles par lot et un temps de présence de 7 à 10 jours. Enfin, deux exploitations en pâturage tournant dynamique (1 parcelle par jour) intègrent le réseau cette année à La Croixille (53) et La Pouëze (49). Les hauteurs d'herbe sont mesurées chaque semaine à l'herbomètre sur l'ensemble des parcelles accessibles au lot. Cette différence entre deux semaines consécutives permet de calculer une croissance en cm/ha/jour convertie en kg MS/ha/jour en multipliant par la densité de l'herbe. Un descriptif des caractéristiques des fermes est disponible sur le site internet Agri72.fr.

Un démarrage tout doux

Les valeurs de croissance affichées ont été calculées sur une ou deux semaines. La croissance moyenne sur les 17 fermes mesurées s'établit à 10 kg MS/ha/j, valeur faible pour la saison. Néanmoins, jusqu'à ces quinze derniers jours, la végétation ne s'est quasiment pas arrêtée (entre 10 et 20 kg MS/ha/j sur les 3 mois d'hiver). Les prairies disposent donc déjà d'une hauteur d'herbe significative, entre 7 et 8 cm en moyenne sur les exploitations du réseau.

Observer les parcelles

Ce sont maintenant les conditions de portance qui vont donner le feu vert pour une mise à l'herbe progressive. Il est nécessaire d'aller faire le tour des parcelles pour constater l'évolution de la portance. C'est également l'occasion de vérifier les clôtures. Les conditions plus « hivernales » de ces derniers jours ne doivent pas faire oublier la mise à l'herbe. Plus elle est précoce, plus la saison de pâturage sera facile à gérer et de qualité. En conditions froides et humides de fin d'hiver, une transition alimentaire sur plusieurs semaines est indispensable. Un apport de magnésie (50 g/vache) permet de prévenir les tétanies d'herbage. En système allaitant, les parcelles ont souvent été exploitées tard dans l'hiver. La date de mise à l'herbe des différents lots est à ajuster selon l'herbe disponible dans les parcelles. Les prairies qui vont être détruites pour une culture de maïs peuvent notamment être

intéressantes dans ces conditions de portance délicates pour engager le pâturage.

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance SVC

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 15 février au 1er	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	NM	NM
Zone Intermédiaire	12	7,1
Zone Sud - Nord Loire	6	7,1
Zone Sud - Sud Loire	12	7,9

