

# Bulletin pousse de l'herbe régional N°2. Rédigé le 08/03/2016

## Croissance ralentie

La croissance observée dans les parcelles du réseau pousse de l'herbe est hétérogène : sur les parcelles les moins précoces de la zone nord les mesures indiquent que la végétation n'est pas encore repartie. C'est la conséquence d'une période plus froide ces derniers jours avec de légères gelées matinales (moyenne de 4 ° de température de l'air et 9° C de températures du sol). La zone sud est aussi hétérogène avec des mesures allant de 2 kg jusqu'à 27 kgs de MS/ha/jour.

La douceur va revenir après un passage pluvieux de milieu de semaine. L'augmentation de la durée de jour va aussi contribuer à accélérer la pousse.

## Sortir tôt

L'état des parcelles sortie hiver est aussi très variable : l'hydromorphie marquée dans certaines parcelles à ressuyage lent ne devra pas limiter la sortie des animaux sur le reste des parcelles : en effet, certaines arrivent à des stades de développement végétatif important (> 12 cm) surtout si elles n'ont pas été suffisamment valorisées jusqu'en fin d'automne. Privilégier encore une fois les parcelles qui seront renouvelées cette année par du maïs.

## Déprimer tôt pour ne pas se laisser déborder

La phase de déprimage acte le démarrage de la saison de pâturage (entre 250 et 300 ° J). Il est donc important de commencer par faire pâturer les parcelles les plus hautes et bien sûr les plus portantes. Il est intéressant de faire sortir les VL sur ces parcelles même avec une durée de pâturage par jour limitée. De même, pour les troupeaux de VA il peut être judicieux de faire des petits lots et sortir sur les parcelles les mieux ressuyées. Vers les 500° jour (courant d'avril) le déprimage doit être terminé.

Les parcelles avec des espèces plus précoces (RGI , RGH) peuvent aussi entrer dans le circuit de pâturage. A la sortie un apport d'azote pourra être réalisé pour la première coupe. Sur les parcelles de fauche, avec une végétation très développée, il faut limiter voire ne pas apporter d'azote pour la première coupe. On conseille plutôt de récolter plus précocement la première coupe, et d'aller chercher qualité et quantité en deuxième coupe.

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance SVC

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 29 février au 07 mars 2016	Hauteur moyenne (cm)	Jours d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)					
			20 ares/VL	30 ares/VL	40 ares/VL	50 ares/VL	40 ares/VA+v	50 ares/VA+v
Zone Nord	3	5,4	1	1	2	2	2	2
Zone Intermédiaire	13	5,3	1	1	1	2	1	2
Zone Sud - Nord Loire	10	6,7	4	6	8	10	7	9
Zone Sud - Sud Loire	13	8,2	7	11	15	19	14	17

