

UNE SEMAINE FAVORABLE POUR LA MISE A L'HERBE

La croissance observée dans les parcelles du réseau pousse de l'herbe est à nouveau hétérogène et légèrement inférieure à la normale.

Croissance ralentie début mars

La croissance a été pratiquement nulle dans certains élevages alors que d'autres atteignent une trentaine de kgs de MS/ha/jour sur la zone sud et 15-20 kgs en zone nord et intermédiaire. Des situations différentes au niveau de l'hydromorphie des sols et de l'intensité de pâturage à l'automne peuvent expliquer ces écarts.

Les hauteurs d'herbe mesurées sont plus importantes en zones sud. Avec une moyenne de jours d'avance approchant déjà les 10 jours pour 30 ares/vl en zone nord Loire et pour 20 ares/vl en sud Loire.

La croissance devrait s'accroître dans les jours à venir dans les parcelles présentant une surface foliaire plus importante, se sera aussi le cas en terre sableuse ou sur les coteaux.

Un anticyclone durable s'est installé sur notre région, le temps frais et ensoleillé devrait permettre le ressuyage des sols et favoriser les mises à l'herbe des laitières, des tarées, mais aussi des premiers lots d'allaitantes et de génisses pleines. Pour favoriser leur acclimatation, un râtelier de foin dans la parcelle est indispensable pour les 3 dernières catégories.

Déprimage

Le premier tour de pâturage appelé aussi déprimage doit être réalisé pour le début avril. Il permet de faire consommer l'herbe d'automne et de favoriser le tallage des graminées. Viser 4 cm herbomètre en hauteur sortie.

Il devient donc urgent de sortir les laitières pour les élevages disposant de plus de 30 ares en 1^{er} cycle pour ne pas se faire déborder par la suite et pour valoriser une herbe de qualité.

Pour les moins de 30 ares, la situation est plus facile à gérer temporairement, mais les conditions météo sont favorables à une réussite de la transition alimentaire et la croissance risque de s'accroître rapidement.

Le déprimage concerne aussi les jeunes semis, cela permet de rappuyer le sol et de réduire le développement des adventices tels que le mouron.

Fertilisation

Les apports d'azote sous forme minérale ou de lisier (30 à 50 unités) sont à réaliser, sauf sur les parcelles à plus de 8 cm qui doivent être d'abord déprimées.

Rédigé le 15 mars 2016

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance SVC

Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 4 au 11 mars 2016	Hauteur moyenne (cm)	Jours d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)						
		20 ares/VL	30 ares/VL	40 ares/VL	50 ares/VL	40 ares/VA+v	50 ares/VA+v	
Zone Nord	12	6,8	4	6	8	11	8	10
Zone Intermédiaire	15	5,6	1	2	3	4	3	3
Zone Sud - Nord Loire	11	7,5	6	9	12	15	11	14
Zone Sud - Sud Loire	19	8,8	9	13	18	22	16	20

