

Bulletin pousse de l'herbe régional N°4 – rédigé le 22 mars 2016

MEME SI LA CROISSANCE STAGNE, CONTINUEZ LE DEPRIMAGE !

Les températures fraîches freinent la croissance de l'herbe. Les animaux sont pour la plupart sortis au pâturage, continuez malgré l'annonce des pluies.

La pousse ne décolle [toujours] pas

Contrairement à ce que l'on pouvait penser, la croissance de l'herbe n'a pas décollé la semaine dernière. Les températures fraîches de la nuit freinent la pousse. Pour 60% des fermes mesurées, la croissance est moins élevée cette semaine que la semaine dernière. Elle varie de 0 à 32 kg MS/ha/jour selon les fermes. Les exploitations où la croissance était la plus élevée la semaine dernière stagnent.

La zone Sud a en moyenne la croissance la plus élevée avec 19 kg MS/ha/jour au sud de la Loire (cf. tableau 1) et la zone intermédiaire la plus faible avec 10 kg MS/ha/jour.

Continuez le déprimage malgré les pluies annoncées

Dans 80% des fermes mesurées, les vaches sont désormais au pâturage. Météo France prévoit des précipitations à partir de vendredi et jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Même si, avec le retour des pluies, on peut craindre d'abîmer les parcelles par le piétinement des animaux, il est important de continuer le déprimage ! Tout retard pris dans ce 1^{er} tour sera préjudiciable à une repousse de qualité. L'objectif est de créer un décalage entre les parcelles. Interrompre le déprimage c'est prendre le risque de se faire déborder par l'herbe dans quelques semaines.

Le piétinement au printemps n'est pas préjudiciable à la productivité globale de la prairie sur l'année. Tant que les vaches ne s'enfoncent pas de plus d'un demi-sabot, continuez à pâturer. Une solution consiste à rediviser des parcelles pour que les vaches limitent les déplacements « inutiles » : ne pas trop nourrir les vaches avant la sortie, changer de parcelle tous les jours pour qu'elles mangent et se couchent sans naviguer à la recherche d'un brin encore non consommé, et limiter le temps de pâturage/jour. Si la portance se dégrade trop, faites pâturer les parcelles les plus saines ou celles qui vont être retournées.

Estimez la quantité d'herbe offerte aujourd'hui

- 1) Estimez la croissance de l'herbe avec le point le plus proche de chez vous. En complément, vous trouverez sur le site internet de votre Chambre d'agriculture le tableau des caractéristiques des fermes du réseau (ares/vache, type de sol, fertilisation...).
- 2) Calculez votre surface disponible au pâturage/UGB par lots.

- 3) Dans le tableau 2, retrouvez la quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/jour. Vous pourrez ainsi estimer la quantité de fourrages conservés (et concentrés) à apporter en complément.

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance SVC

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 11 au 18 mars 2016	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	11	6,4
Zone Intermédiaire	10	5,5
Zone Sud - Nord Loire	12	7,7
Zone Sud - Sud Loire	19	8,2

Tableau 1 : Croissance et hauteur par zone

Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
15	2,3	3	3,8	4,5	5,3	6	7,5	9
20	3	4	5	6	7	8	10	12
30	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
40	6	8	10	12	14	16	20	24

Tableau 2 : Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j

