

La pousse végète mais l'herbe s'accumule

Une croissance hétérogène

Avec à peine 40 kg MS/ha/j sur la dernière semaine, la croissance de l'herbe se situe en dessous de la moyenne régionale pour un début avril. Cette moyenne cache néanmoins de grandes disparités avec des croissances qui varient de 20 à 60 kg MS/ha/j entre les sites. Les températures restent relativement basses notamment en matinée. **Un léger gradient nord/sud** est observé mais cette hétérogénéité est aussi liée à la capacité des sols à se réchauffer. Ainsi, sur la ferme expérimentale de Derval (terres limono-argileuses froides), des relevés de températures de sol effectués lundi dernier (11 avril) ont affiché des températures passant de 10°C à 10 h à seulement 12°C à 16 h. **Les exploitations situées sur des terres froides et/ou hydromorphes, sont donc pénalisées.**

L'herbe s'accumule néanmoins...

Les conditions climatiques des dernières semaines, marquées par une pluviométrie conséquente, ont perturbé le rythme d'exploitation des paddocks. Les temps de pâturage ont été fortement réduits et dans de nombreux cas les animaux ont dû être rentrés plusieurs journées. L'herbe, malgré une croissance modeste, continue donc à s'accumuler. Les jours d'avance dans de nombreuses exploitations oscillent entre 15 à 20 jours et certains paddocks atteignent voire **dépassent 14 à 16 cm à l'herbomètre**. Par ailleurs **les hauteurs sorties sont relativement élevées pour la saison** (entre 6 à 7 cm à l'herbomètre).

Maintenir une exploitation cohérente de l'herbe

La croissance devrait s'accélérer sur les prochaines semaines. Il s'agit d'adapter la conduite du pâturage afin de maintenir un rythme cohérent d'exploitation de l'herbe.

Accroître la part d'herbe pâturée : dans certains élevages, il s'agira d'effectuer une transition rapide et la mise en œuvre d'un pâturage jour/nuit très prochainement. Il faut tout de même veiller à assurer une complémentation en fibres suffisante voire à apporter 50 g de **magnésie calcinée** tant que la situation à risque (herbe jeune, temps froid) perdure.

Débrayer dès maintenant les paddocks les plus avancés : un débrayage précoce des paddocks est à envisager lorsque la hauteur atteint plus de 14/15 cm. Un fauchage à 7/8 cm favorisera l'aération de l'andain et permettra une repousse rapide pour réintégrer ces paddocks dans le circuit de pâturage. Ces récoltes pourront coïncider prochainement avec les récoltes de RGI dérobé. Il s'agira de saisir l'opportunité d'une fenêtre météorologique favorable de 2 à 3 jours pour assurer un préfanage suffisant. Cette fauche précoce favorisera également l'accès à la lumière du trèfle.

En termes de fertilisation, pour les paddocks disposant de 20 à 30 % de trèfle, celle-ci s'avère inutile, pour ceux moins riche en trèfle, une trentaine d'unité d'azote favorisera la repousse.

Rédigé le 12 avril 2016

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance SVC

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 04 au 11 Avril 2016	Hauteur moyenne (cm)	Jours d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)					
			20 ares/VL	30 ares/VL	40 ares/VL	50 ares/VL	40 ares/VA+v	50 ares/VA+v
Zone Nord	31	7,8	7	11	14	18	13	16
Zone Intermédiaire	42	7,5	6	9	12	15	11	14
Zone Sud - Nord Loire	39	9,5	11	17	22	28	21	26
Zone Sud - Sud Loire	44	10,5	13	20	27	34	25	31

