

S'ADAPTER AU VOLUME D'HERBE PRESENT !

Malgré un temps chaotique la semaine dernière (couverture nuageuse, averses locales, gelées) la pousse de l'herbe était de 54 kgs de MS/ha/jour en moyenne sur la région des Pays de Loire. La pousse est cependant inférieure en zone nord avec 33 kg et homogène sur les autres zones entre 50 à 60 kg. Les écarts de croissance sont étroitement liés aux hauteurs d'herbe moyennes des exploitations.

Corriger les hauteurs sorties

Les conditions de portance n'ont pas permis de raser suffisamment certaines parcelles. Il semble nécessaire de faire un retour sur les parcelles insuffisamment rasées (objectif sortie 5 cm herbomètre) de façon à limiter le développement des graminées à épiaison précoce. Tout en sachant qu'au fil des cycles, la hauteur sortie est toujours en augmentation.

Les précipitations annoncées au cours de la semaine à venir ne devraient pas être un frein au pâturage.

Modifier les rations

Dans le réseau, les systèmes les plus herbagers (+ de 40 ares) ont fermé les silos ou décidé de débrayer certaines parcelles. Avec 10-12 jours d'avance pour les vaches laitières la fermeture des silos peut s'envisager.

A 25 ares, le maïs doit représenter moins de 8 kgs de MS/vl/jour.

Dans le cas où l'on maintient davantage de maïs, il faudra choisir de faucher précocement certaines parcelles, de façon à les réintégrer dans le circuit de pâturage rapidement par la suite.

C'est aussi le moment de réduire le coût de concentré et alimentaire. La réduction sera d'autant plus importante si la part de maïs est réduite et si l'offre d'herbe est de qualité. Le pâturage jour-nuit peut sereinement se faire pour augmenter la part d'herbe ingérée.

Sortir les autres lots

Aussi bien au niveau des génisses laitières qu'en allaitant, la sortie a été retardée. Si les animaux entrent dans des parcelles où l'herbe est déjà haute voire épiée, le redécoupage en parcelles plus petites évite le gaspillage. Si besoin, des animaux à besoins modérés peuvent finir les parcelles. Même si ces animaux peuvent valoriser une herbe plus riche en tiges, le niveau de pousse à venir dans les prochaines semaines risque d'obliger à faucher plus de parcelles que prévu initialement. Celles-ci seront à nouveau pâturables environ un mois après la fauche et permettront d'offrir une herbe de qualité au bon stade.

Rédigé le 19 avril 2016

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance SV

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 11 au 19 Avril 2016	Hauteur moyenne (cm)	Jours d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)					
			20 ares/VL	30 ares/VL	40 ares/VL	50 ares/VL	40 ares/VA+v	50 ares/VA+v
Zone Nord	33	8,0	7	11	15	18	13	17
Zone Intermédiaire	50	8,1	8	12	15	19	14	18
Zone Sud - Nord Loire	59	11,2	15	23	31	38	28	35
Zone Sud - Sud Loire	57	10,7	14	21	28	35	26	33

Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
30	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
40	6	8	10	12	14	16	20	24
50	7,5	10	12,5	15	17,5	20	25	30
60	9	12	15	18	21	24	30	36

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j



