

PÂTUREZ ET RECOLTEZ AVANT DE VOUS FAIRE DEBORDER

La semaine dernière, les gelées blanches du matin ont ralenti la pousse de l'herbe. Cette semaine les températures remontent, l'herbe va pouvoir exprimer tout son potentiel.

Les hauteurs d'herbe sont assez élevées avec 11 cm herbomètre en moyenne. Les croissances sur la région vont de 36 kg MS/ha/jour dans la zone Nord à 56 kg MS/ha/jour dans la zone Sud.

Sortir tous les lots en viande / pâturage jour + nuit en lait

Il n'y a plus de problème de portance. Sur les parcelles où l'herbe est avancée, augmenter le chargement/ha ou restreindre la surface des parcelles pour limiter le tri par les animaux et éviter d'avoir à faucher les refus. Laisser des refus, c'est empêcher une bonne repousse et sélectionner les espèces les moins appétentes. Les lots d'animaux qui ne sont pas encore sortis au pâturage doivent y aller, y compris les jeunes de moins d'un an. Il est plus intéressant économiquement de garder un lot de génisses à inséminer en bâtiment et de sortir des plus jeunes au fil des confirmations de gestation, on opérera un turn-over au pâturage. En lait c'est le moment de passer en pâturage jour + nuit. Avec un nombre de jours d'avance suffisant, continuez à diminuer la part de maïs ensilage. Avec plus de 30 ares/vache et 15 jours d'avance au pâturage, on peut arrêter le maïs ensilage.

Ensiler ou enrubanner pour ne pas se faire déborder

Profitez du beau temps pour continuer de récolter en ensilage ou en enrubannage les parcelles les plus avancées. La récolte en foin est trop risquée : le pouvoir évaporant de l'air et surtout la durée du jour restent encore trop faibles. Certains hésitent à débrayer par peur de manquer d'herbe au pâturage. Au-delà de 15 jours d'avance, allez-y avant de vous faire déborder ! Les légumineuses se sont peu exprimées à cause de la fraîcheur de ce printemps. La fauche ou un pâturage efficace va leur permettre d'accéder à la lumière et de booster leur croissance.

Les luzernes sont plus tardives cette année

Les luzernes ont pris du retard. Un bon compromis entre rendement et qualité : le stade début bourgeonnement. Il est donc préférable d'attendre. Sur les parcelles sales, une coupe précoce permet de nettoyer et d'avoir une bonne repousse. Profitez des ensilages de prairies temporaires pour faire un silo sandwich avec la luzerne.

Rédigé le 2 mai 2016

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance SV

Zone	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) 25 avril-2 mai 2016	Hauteur moyenne (cm)	Jours d'avance au pâturage (hauteur de pâturage 5 cm)					
			20 ares/VL	30 ares/VL	40 ares/VL	50 ares/VL	40 ares/VA+v	50 ares/VA+v
Zone Nord	36	9,0	9	14	18	23	17	21
Zone Intermédiaire	47	10,0	11	17	23	29	21	26
Zone Sud - Nord Loire	52	12,5	17	26	35	43	32	40
Zone Sud - Sud Loire	56	12,5	17	26	34	43	31	39

