

POUSSE AU RALENTIE, VALORISER L'HERBE DISPONIBLE

Sur la quinzaine du 26 septembre au 10 octobre, la moyenne de croissance sur les 18 fermes mesurées s'établit à 11 kg MS/ha/jour avec des valeurs entre 0 et 25 kg MS.

La météo toujours facteur limitant

La météo joue toujours les trouble-fêtes. Le manque d'eau est toujours d'actualité et les premières gelées sont apparues par endroit. Ces conditions, avec des températures matinales froides, limitent la pousse. Celle-ci est désormais compromise en grande partie, même si les conditions météorologiques se radoucissent, la durée de jour limite la croissance. On peut désormais tabler que sur des croissances autour de 20 kg de MS maxi par hectare et par jour.

Prendre ce qui est à prendre.

Les mesures ne sont pas en progression, au contraire. Néanmoins un « petit » stock s'accumule parfois selon le pâturage préalable. On observe des plantes séchées (carottes sauvages, picris, ...) qui créent des zones de refus, le pâturage par des génisses, le broyage ou le passage de giro broyeur peuvent égaliser ces zones et favoriser ainsi la production ultérieure de la prairie.

La quantité d'herbe à valoriser est faible mais reste à faire consommer malgré tout. Attention toutefois à éviter les situations de surpâturage.

Suite à la sécheresse estivale, il est intéressant d'observer la flore de chaque parcelle. La disparition de graminées ou légumineuses sélectionnées sera préjudiciable à la productivité au printemps 2017. Mais attention toutefois au jugement trop hâtif, car dans certains cas, toute la flore n'est pas encore totalement bien répartie. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de regarnissage hivernal de la prairie. De plus, le retournement dès l'automne priverait le troupeau de la production printanière dans un contexte de stocks parfois tendue.

Lait

Il faut éviter les transitions alimentaires brutales et donc maintenir une petite part d'herbe et la faire varier le cas échéant avec le temps de pâturage par jour.

Viande

Pour la même raison, on va alléger les lots et faire tourner les animaux sur les parcelles tant qu'il y aura de l'herbe.

Mauvaises herbes et prairies

Pour les implantations d'automne, la gestion des flores d'annuelles se fera par fauche ou pâturage de printemps. Un désherbage chimique automnal


sur des plantules déjà en situation délicate (levées échelonnées et stades très variés) risque d'accentuer la perte de pieds. Pour la gestion des vivaces, nous sommes en période de sève descendante (la plante fait ses réserves en racine) période favorable pour une intervention mécanique ou chimique, (sous réserve d'amplitude thermique plus faible qu'actuellement).

Dernière coupe de légumineuses de fauche

Cette fauche doit se faire 10-15 jours avant les gelées hivernales pour ne pas trop fatiguer les pieds avant l'hiver. Toutefois en dessous de 15 cm de hauteur, soit 6-700 kg de matière sèche, il est préférable de ne rien faire.

Rédigé le 13 octobre 2016

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, CLASEL, Bovins Croissance Sèvres Vendée.



Croissance de l'herbe
par zone en kg