

# Bulletin pousse de l'herbe régional N°20 - Rédigé le 03/10/2017

## Ça pousse !

Comme on pouvait s'y attendre, la pousse de l'herbe a augmenté sur la seconde quinzaine de septembre pour atteindre une moyenne à 30 kg MS/ha/jour. Elle est excellente en zone Intermédiaire mais très disparate en zone Sud (sud et nord Loire) : un reflet des « arrières-effets » de la sécheresse plus ou moins longue et intense combinée à des pratiques plus ou moins salvatrices.

## Profitez ...

Il y a donc plus ou moins d'herbe à pâturer selon les secteurs, mais plus qu'il y a 15 jours. Cela se traduit par une augmentation des hauteurs moyennes qui oscillent entre 7 et 8,5 cm. L'herbe est de bonne qualité : riche en trèfle, composée de jeunes repousses suite à l'arrêt estival, et présentant peu de maladies (hors quelques traces sur RGA et trèfle violet). De plus, les conditions de pâturage sont idéales : il faut en profiter !

La pousse varie de moins de 10 à plus de 50 kg MS/ha/jour, donc la quantité d'herbe offerte est très variable également. Par exemple, pour un système à 25 ares par UGB, si la pousse est de 20 kg MS/ha/jour alors les animaux ont 5 kg MS d'herbe dans la ration, alors qu'avec 50 kg MS/ha/jour de pousse ils ont 13 kg MS soit les 3/4 de leur ration en herbe.

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 18 septembre au 2 octobre 2017
<b>Zone Nord</b>	31
<b>Zone Intermédiaire</b>	44
<b>Zone Sud - Nord Loire</b>	29
<b>Zone Sud - Sud Loire</b>	36
<b>MOYENNE REGION</b>	30

Zone Nord : 1 seule ferme mesurée

Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
20	3	4	5	6	7	8	10	12
30	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
40	6	8	10	12	14	16	20	24
50	8	10	13	15	18	20	25	30
60	9	12	15	18	21	24	30	36
80	12	16	20	24	28	32	40	48

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j

## ... tant que vous le pouvez !

Même si elle n'est pas limitante en ce début octobre, la portance peut vite se dégrader selon la météo. En toute logique, faites pâturer les parcelles que vous savez être les moins portantes rapidement, afin qu'elles bénéficient d'un pâturage avant l'hiver : cela stimule le tallage, la proportion de trèfle et la reprise au printemps, en évitant le gaspillage d'une herbe qui pourrait tout l'hiver ... alors qu'on est confronté à une pénurie fourragère dans certains élevages.

## Deux difficultés : des laitières qui boudent et des allaitantes qui surpâturent

A cette époque, l'appétence peut être moindre. C'est d'autant plus vrai dans les systèmes qui bénéficient de peu d'ares par vache laitière : les déjections contaminent olfactivement les prairies et les vaches préfèrent rester à l'auge, surtout que leurs prairies comportent beaucoup de RGA dont certaines variétés

sont sensibles aux maladies. Le 1<sup>er</sup> levier est de diminuer la ration à l'auge en fonction de l'herbe offerte (voir tableau). Si elles pâturent moins d'une heure après l'entrée en parcelle, c'est qu'elles ont déjà trop mangé à l'auge. Le 2<sup>nd</sup> levier est de faire passer un autre lot (génisses et tarées par exemple) derrière les vaches pour finir la parcelle. Ce lot doit être assez gros pour finir rapidement et ne pas décaler la rotation des parcelles.

En élevage allaitant, mieux vaut faire tourner que tout ouvrir, tant pour les vaches suitées que pour les gestantes. Attention à proposer des parcelles avec des haies pour abriter les petits veaux : les températures varient beaucoup dans la journée.

## Le semis sous couvert, une opportunité

Il est encore possible de semer du RGI et RGH mais pour les autres espèces prairiales, plus lentes d'installation, c'est trop tard ... à moins de les planter sous couvert de céréale d'hiver. Cette technique montre de bons résultats sous réserve d'une bonne correspondance entre la céréale de couverture et la prairie à installer. Retrouvez plus d'infos : [http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user\\_upload/National/FAL\\_publications/Pays\\_de\\_la\\_Loire/2017\\_semis\\_prairies\\_sous\\_couvert\\_cereales\\_hiver\\_pour\\_secourir\\_implantation.pdf](http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_publications/Pays_de_la_Loire/2017_semis_prairies_sous_couvert_cereales_hiver_pour_secourir_implantation.pdf)



Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, Bovins Croissance SVC