

Bulletin pousse de l'herbe régional N°21 - Rédigé le 18/10/2017

Une pousse stable !

La croissance se maintient à un niveau de saison avec 26 kg de MS par jour et par hectare. Ce, grâce à des températures favorables malgré un manque de précipitations confirmé dans certains secteurs.

On continue tant que l'on peut ...

Il y a de l'herbe à valoriser dans les parcelles aujourd'hui, et elle peut représenter d'un quart à une demi-ration suivant la surface accessible en lait. En allaitant la qualité et la quantité donnent la possibilité de répondre aux besoins sur une partie du cheptel. La remise en place d'un pâturage comme au printemps doit permettre d'économiser du correcteur tout en permettant aussi une économie de fourrage et de paille. La pluie annoncée reste un facteur favorable pour la croissance tant que la quantité tombée reste « acceptable ». Les sols ont aujourd'hui la capacité à supporter un passage pluvieux conséquent sans être saturés. Un niveau de pousse autour de 20-25 kg MS/ha/j peut se maintenir encore dans les semaines à venir, il doit servir à miser sur le pâturage le plus longtemps possible. La météo de la semaine prochaine reste encore favorable avec peu d'amplitude thermique et de l'eau. Les minima annoncés en températures restent autour des 10°C avec une faible amplitude journalière

La qualité au service de l'économie...

La priorité est le maintien, tant que c'est possible, de cet apport de qualité dans la ration, le plus longtemps possible sur les lots exigeants en réduisant ainsi le coût alimentaire. Il est important de ne pas se priver d'un tel bénéfice dans le contexte de déficit fourrager et de prix difficile.

un choix économique de faire à la fois un « désherbage » et une économie de fourrage, tant que les conditions le permettent. Avec les semis précoces de cette année, on observe actuellement quelques chantiers de fauches plus ou moins anecdotiques selon les secteurs. Attention à la conservation de ces fourrages (MS). Il sera préférable de les faire consommer rapidement. Le broyage reste possible mais la valorisation en pâturage ou fauche reste très conseillée. Trop de végétation broyée génère des amas qui créent des trous et ainsi permettre l'installation d'indésirables.

Si les méthodes de gestion alternatives (fauche et broyage) n'ont pas suffi à gérer les vivaces en prairies installées, l'usage de désherbant sélectif peut s'envisager car l'efficacité sera améliorée en sève descendante (attention dans le respect des restrictions d'usage et conditions d'applications).

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 2 octobre au 16 octobre 2017	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	27	7,7
Zone Intermédiaire	31	7,7
Zone Sud - Nord Loire	22	7,2
Zone Sud - Sud Loire	32	8,5
MOYENNE REGION	26	

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil Elevage, Bovins Croissance SVC



Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
20	3	4	5	6	7	8	10	12
30	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
40	6	8	10	12	14	16	20	24
50	8	10	13	15	18	20	25	30
60	9	12	15	18	21	24	30	36
80	12	16	20	24	28	32	40	48

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j

Un désherbage par le pâturage en nouvelles prairies et dérochées !

Les semis précoces sont assez développés et peuvent donner lieu à du pâturage si les conditions de portance sont bonnes. Il permettra d'assurer un 1^{er} « désherbage » et de remettre la végétation à un stade plus réduit avant. C'est