

Bulletin pousse de l'herbe régional N°22 - Rédigé le 31/10/2017

La croissance faible, mais encore de l'herbe à pâturer !

La croissance ralenti progressivement, mais nous avons toujours de forts contrastes de pousse dans les exploitations du réseau (de 5 kg de MS/ha /jour dans la zone sud-nord Loire à 35 en nord Mayenne et en zone plus chaude sud Loire)

Les hauteurs d'herbe diminuent ...

Avec une moyenne des hauteurs proches de 7 cm, le stock d'herbe disponible s'amenuise. Mais certaines fermes sont encore à 8.5 cm.

Le sol est encore chaud (16° C) donc favorable à la croissance. Mais les faibles précipitations d'octobre (35mm en moyenne en Loire atlantique) sont, en zone sud, le facteur limitant. Les passages dans les parcelles sont rapides et le retour, s'opère sur des hauteurs faibles.

De 5 à 15 kgs de MS offerte/jour/UGB

Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
20	3	4	5	6	7	8	10	12
30	4,5	6	7,5	9	10,5	12	15	18
40	6	8	10	12	14	16	20	24
50	8	10	13	15	18	20	25	30
60	9	12	15	18	21	24	30	36
80	12	16	20	24	28	32	40	48

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j

Les premières gelées de cette semaine sont aussi des freins à la pousse de l'herbe. Les stocks d'herbe ont pu être consolidés avec de bonnes coupes (biomasse/valeur d'enrubannage).

Qualité des jeunes prairies

Un pâturage léger (faible chargement) sur de jeunes pâtures est propice pour la qualité de la prairie : rappuyage, lumière pour le trèfle, désherbage des annuelles (stellaires...).

En bref : continuez à pâturer, les pluies ne sont malheureusement pas attendues (!) dans les prochains jours.

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, Elevage Conseil Loire Anjou, Atlantic Conseil élevages

Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 16 au 31 octobre 2017

Zone Nord	28
Zone Intermédiaire	25
Zone Sud - Nord Loire	16
Zone Sud - Sud Loire	27
MOYENNE REGION	20

