

Bulletin pousse de l'herbe régional N°4 - Rédigé le 20/03/2018

La croissance de l'herbe au ralenti

Nous indiquons sur la carte la moyenne des croissances des 8 derniers jours. Sur certaines fermes la pousse s'est maintenue avec des croissances supérieures à 30 kg MS/ha/jour. Cependant, la fraîcheur de l'air accompagnant les journées de pluies freine la pousse.

Dans les parcelles du réseau les hauteurs moyennes varient de 4.5 à 11 cm herbomètre.

Mise à l'herbe : dès que le ressuyage des parcelles le permet

Nous observons des hauteurs d'herbe conséquentes avec plus de 9 cm herbomètre dans bon nombre de parcelles.

Dès que les parcelles retrouvent une portance acceptable, il est impératif de sortir. Certes, le temps froid de cette semaine va bloquer les croissances, mais on a déjà des stocks d'herbe disponibles pouvant atteindre plus de 10 jours d'avance dans certaines fermes du réseau.

Les températures de février-mars sont froides, en dessous des normales : les 500°J ne seront atteints que dans une vingtaine de jours minimum, alors qu'ils avaient été atteints le 27 mars en Loire Atlantique. Les 500°J c'est le repère de fin de déprimage !

Choix des parcelles... à pâturer

La priorité c'est de pâturer ! Les parcelles qui vont être retournées pour une culture de printemps seront à privilégier. Les parcelles de RGI peuvent aussi être pâturées. Pour les vaches allaitantes et les génisses, sortir des petits lots en redivisant les parcelles et en changeant fréquemment pour limiter les piétinements.

... et celles pour implanter le maïs

Si vous devez retourner des prairies pour implanter du maïs, attendez le redémarrage pour faire votre choix. On est parfois surpris, ce ne sont pas toujours les plus vieilles prairies qui s'en sortent le moins bien. Certaines ont pu souffrir de la sécheresse à l'été-automne dernier.

Diminuer la part de concentrés distribuée

Pour les vaches laitières, si le pâturage se substitue à l'ensilage d'herbe en conservant le même niveau de maïs, il est possible de diminuer la part de concentrés. **Valeur** d'une prairie RGA-TB au pâturage en début de printemps : 0.95 UFL, 24 % MAT, 110 PDIE/125 PDIN.

Le pâturage au fil en début de printemps est très intéressant car il permet un bon pâturage : on adapte l'offre au besoin. L'avancée du fil tous les jours permet de se rendre compte de la portance et de la hauteur d'herbe. Pour des hauteurs d'herbe de 12 cm, prévoir 1 are par VL par jour ce qui correspond à 16 kgs de MS herbe à ingérer avec un apport à l'auge très réduit

Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, SEENOVIA

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 12 au 19 mars 2018	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	19	5,5
Zone Intermédiaire	19	5,6
Zone Sud - Nord Loire	24	6,9
Zone Sud - Sud Loire	24	8,0
MOYENNE REGION	23	6,7

20/03/2018 Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB							
	15	20	25	30	35	40	50	60
10	2	2	3	3	4	4	5	6
15	2	3	4	5	5	6	7,5	9
20	3	4	5	6	7	8	10	12
25	4	5	6	8	9	10	13	15
30	5	6	8	9	11	12	15	18
35	5	7	9	11	12	14	18	21
Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j								



