

Bulletin pousse de l'herbe régional N°8 - Rédigé le 17/04/2018

Températures en hausse, la croissance décolle

Les températures en hausse et le soleil font **décoller la croissance de l'herbe cette semaine pour atteindre en moyenne 55 à 60 kg MS/ha/jour**, supérieure aux moyennes pluriannuelles. Les prévisions météo à 10 jours annoncent un maintien de bonnes conditions de pousse, la croissance sera donc encore supérieure cette semaine.

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 9 au 16 avril 2018	Hauteur moyenne (cm)
Zone Nord	48	6,5
Zone Intermédiaire	59	10,5
Zone Sud - Nord Loire	56	9,9
Zone Sud - Sud Loire	61	9,7
MOYENNE REGION	57	9,5

Comment gérer une mise à l'herbe tardive avec une herbe déjà haute ?

L'important est de ne pas gaspiller :

- ✓ Rediviser les parcelles ou faire pâturer au fil.
- ✓ Il est illusoire de vouloir « passer rapidement partout » car l'herbe est trop haute. Ne changer de parcelle que quand les animaux ont consommé l'ensemble de la parcelle (sauf problème de portance persistant).
- ✓ Sortir le maximum d'animaux au pâturage (transition rapide).
- ✓ **Débrayez dès maintenant une partie des parcelles pour les faucher** (sans les faire pâturer). **Attention à ne pas tout réserver en foin, vous risqueriez de manquer d'herbe dès juin ! Echelonnez les fauches** en récoltant une partie en ensilage ou enrubannage précoces (= qualité), ces parcelles seront bonnes à pâturer mi-mai. Même si faucher plusieurs petites parcelles semble peu efficace, ces fauches-là se font au service du pâturage et décaleront les foin à une période plus favorable.
- ✓ Si la surface est limitante (<30 ares/UGB) mais que l'herbe est haute, débrayez si vous avez au moins 10-12 jours d'avance. Là encore, optez pour une fauche précoce.

Adapter la ration en lait :

Avec une croissance de 60 kgs MS/ha/j :

- **30 ares/VL** : vous pouvez passer en ration 100% herbe
- **20 ares/VL** : l'herbe devrait représenter 2/3 de la ration (5-6 kgs MS de fourrages complémentaires distribués)

Croissance (kgMS/ha/j)	ares disponibles/UGB				
	20	25	30	40	50
30	6	8	9	12	15
40	8	10	12	16	20
50	10	13	15	20	25
60	12	15	18	24	30
70	14	18	21	28	35
80	16	20	24	32	40

Quantité d'herbe offerte en kg MS/UGB/j

Sorti il y a plus de 3 semaines, vous commencez à chercher l'herbe ?


Avoir l'impression de manquer un peu d'herbe est souvent signe que l'on « pilote bien » sa mise à l'herbe. Maintenant que la pousse a démarré, vous allez pouvoir en profiter pleinement avec sérénité ! **Fin avril, conservez 25 jours de repos entre 2 pâturages pour maximiser la valorisation d'herbe.**

Ensilages : attention au tassement et au taux de matière sèche

Testez la portance avant de sortir le matériel dans les prairies que vous comptez garder. On peut retrouver pendant des années les marques d'ensilages en conditions humides. Pour une bonne conservation, **viser 35% MS**. Cela implique de **faucher haut ≥ 10 cm**. Plusieurs avantages : on laisse le bas de la gaine qui a peu de valeur, on évite de ramasser les cailloux et on améliore la ventilation sous l'andain – cruciale avec un sol encore gorgé d'eau. Il est également **impératif de faner**. Un simple regroupement d'andain ne permet pas un séchage suffisant.

* Sur ces fermes, les animaux viennent juste de sortir à l'herbe avec des hauteurs élevées. La croissance est alors très forte pour la saison :

- 114 kg MS/ha/j à MAUGES SUR LOIRE (49),
- 110 kg MS/ha/j à BAZOUGES (53),
- 101 kg à MARTIGNE SUR MAYENNE (53),
- 101 kg à CHANTENAY VILLEDIEU (72),
- 106 kg à BEAUMONT PIED DE BŒUF (72).



Action partenariale : Chambres d'agriculture Pays de la Loire, SEENOVIA